DECOUPAGE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN PETITES REGIONS NATURELLES

Junin 1990

Auteurs : C. RIPERT
D. NOUALS
A. FRANC

Coordination : B. BOISSEAU

Dactylographie : D. BREIL

Division Techniques
Forestières Méditerranéennes

DECOUPAGE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN PETITES REGIONS NATURELLES

C. RIPERT, D. NOUALS, A. FRANC

Ce document est le résultat d'une étude réalisée par le CEMAGREF au sein des divisions techniques forestières d'Aix-en-Provence et de Clermont-Ferrand.

Il présente un découpage de la région Languedoc-Roussillon en petites régions naturelles.

Il s'agit d'un travail qui s'inscrit dans le cadre des études du milieu forestier et de ses potentialités.

Avant d'aborder les études de typologie des stations proprement dites, la définition de petites régions naturelles permet, de dégager les principaux facteurs caractérisant le milieu forestier.

Il s'agit du climat et de la lithologie.

Le travail est articulé en deux étapes :

- Une étape typologique qui a permis de définir les grands types de climat et de substrat,
- Une étape cartographique qui a consisté dans l'adaptation et le report sur carte des types définis précédemment.

65 petites régions naturelles ont ainsi été délimitées et constituent 6 ensembles de régions écologiquement apparentées.

L'ouvrage est présenté en trois parties :

- Une carte au 1/500.000^e,
- 5 tableaux départementaux où chaque petite région naturelle est décrite sommairement (climat, substrat, relief, étages de végétation),
- un texte présentant la méthode utilisée.

Les petites régions naturelles ainsi définies pourront ensuite servir de cadre pour des études de typologie des stations et d'autécologie des essences.

Elles peuvent aussi d'ores et déjà constituer un outil d'aide à la décision pour les responsables forestiers lorsque ceux-ci désirent prendre en compte les facteurs du milieu à l'échelle départementale ou régionale.

Le Tholonet, le 7 septembre 1990

**DECOUPAGE DU
LANGUEDOC-ROUSSILLON EN
PETITES REGIONS NATURELLES**

Juin 1990

Auteurs : C. RIPERT
D. NOUALS
A. FRANC

Coordination : B. BOISSEAU

Dactylographie : D. BREIL

Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

Groupement d'Aix-en-Provence
Division Techniques Forestières Méditerranéennes
Le Tholonet, B.P. 31
13612 AIX-EN-PROVENCE

Groupement de Clermont-Ferrand
Division Techniques Forestières
Domaine de Lалуas
63200 RIOM

SOMMAIRE

	Pages
SOMMAIRE	2
AVERTISSEMENT	3
1 - PRESENTATION	4
2 - LA TYPOLOGIE	5
2.1 - Etude climatique	5
2.1.1 - Etude de la pluie	5
2.1.2 - Etude de la température	11
2.1.3 - Synthèse "pluie-température"	14
2.2 - Etude lithologique	16
3 - LA CARTOGRAPHIE	20
3.1 - Le passage de la typologie à la cartographie	20
3.2 - Découpage en petites régions naturelles	20
3.2.1 - Cartographie des types lithologiques	20
3.2.2 - Cartographie des types pluviométriques	21
3.2.3 - Cartographie des types thermiques	21
3.2.4 - Superposition des secteurs lithologiques, pluviométriques et thermiques	22
3.3 - Conclusion : quelques remarques sur la précision	22
4 - CARTES ET TABLEAUX EXPLICATIFS	24
4.1 - Cartes	24
4.2 - Tableaux explicatifs	24
BIBLIOGRAPHIE	25
TABLEAUX ET CARTES JOINTES	

AVERTISSEMENT

Ce document constitue la version complétée et définitive, pour le Languedoc-Roussillon, d'un précédent rapport intitulé "Proposition de découpage interrégional en secteurs écologiques homogènes dans la zone méditerranéenne française" diffusé de façon restreinte en 1989.

Introduction

The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the project's objectives, scope, and timeline. The project aims to develop a robust system that can handle large-scale data processing and analysis. The scope of the project includes the design, development, and deployment of the system, as well as the implementation of security measures to protect the data. The timeline for the project is estimated to be 12 months, with a focus on delivering a functional prototype by the end of the first quarter.

The project is organized into several key phases: requirements gathering, system design, development, testing, and deployment. Each phase is supported by a dedicated team of experts in their respective fields. The requirements gathering phase will involve extensive stakeholder interviews and the creation of a detailed requirements document. The system design phase will focus on creating a scalable architecture that can support the project's goals. The development phase will involve the implementation of the system's core components, followed by rigorous testing to ensure the system's reliability and performance. Finally, the deployment phase will involve the rollout of the system to the production environment, with ongoing support and maintenance.

The project's success is contingent upon the effective collaboration and communication between all team members. Regular meetings and status reports will be used to track progress and address any challenges that arise. The project manager will be responsible for ensuring that the project stays on schedule and within budget. The project's progress will be monitored closely, and any deviations from the plan will be addressed promptly. The project's success will be measured by the timely delivery of a functional system that meets the project's objectives and the satisfaction of the stakeholders.

1 - PRESENTATION

Le découpage en régions naturelles de la région Languedoc-Roussillon s'inscrit dans une démarche d'ensemble adoptée par le CEMAGREF pour l'étude du milieu forestier.

Cette démarche a débuté en région méditerranéenne puis dans le Massif Central et se poursuit maintenant dans les Alpes. Elle a plusieurs applications:

- La définition de petites régions naturelles permet, avant d'aborder les études stationnelles proprement dites, de dégager les principaux facteurs autour desquelles vont se distribuer logiquement les différents types de milieu. Ces facteurs sont d'une part le climat, et d'autre part le substrat.

En d'autres termes, la combinaison d'une roche et d'un climat ne peut évoluer que vers un nombre limité de types de station, que l'on pourra définir par une étude des facteurs stationnels.

- D'autre part les études d'autécologie des essences, qui ont été particulièrement développées en région méditerranéenne, pourraient gagner en finesse et en précision si la région étudiée était plus restreinte et mieux définie écologiquement (groupes de régions naturelles apparentées).

- Enfin, il ne faut pas négliger l'outil d'aide à la décision que peut constituer un tel document pour les responsables forestiers lorsque ceux-ci désirent prendre en compte les facteurs écologiques à l'échelon départemental ou régional.

La méthode utilisée s'articule en deux étapes distinctes :

- Une étape typologique qui a permis de définir les grands types de climat et de substrat.
- Une étape cartographique, qui a consisté dans l'adaptation et le report sur cartes des types définis précédemment.

Introduction

The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the project's objectives, scope, and the methodology used to achieve the desired outcomes. This section will detail the background information, the specific goals of the project, and the approach taken to address the challenges identified. The document is structured to guide the reader through the project's progression, from initial planning to the final results and conclusions.

The project was initiated in response to the need for a more efficient and effective way to manage the organization's resources. The primary objective was to identify the key areas of inefficiency and develop a plan to address them. This involved a thorough analysis of the current processes and the identification of the most significant bottlenecks. The methodology used was a combination of qualitative and quantitative research, including interviews with key stakeholders and the use of data analysis tools.

The results of the project have been highly positive, with significant improvements in efficiency and effectiveness. The project has demonstrated that it is possible to achieve these goals through a combination of careful planning, effective communication, and a commitment to continuous improvement. The findings of this project will be used to inform future projects and to ensure that the organization remains at the forefront of its industry.

2 - LA TYPOLOGIE

2.1 - Etude climatique

Pour définir les grands types climatiques, tous les postes climatiques et toutes les stations professionnelles des régions administratives Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon sont considérés. Mais seuls sont retenus les 365 postes fournissant :

- des données de **pluie sur 30 ans (1951-1980)**, période minimale pour esquisser des normales avec une certaine fiabilité;
- des données de **températures sur 10 ans (1971-1980)** seulement, car les variations inter-annuelles des températures sont faibles.

Leur effectif respectif est réduit à :

- . 320 postes pluviométriques (répartis assez uniformément)
- . 173 postes thermiques (assez mal distribués géographiquement)
- . 128 postes pluviothermiques (compris dans les précédents).

Vu l'étendue de la région d'étude, il est exclu d'appréhender de façon satisfaisante les différents types climatiques qui la caractérisent à partir des seuls 128 postes possédant à la fois des relevés de pluie et de température. C'est pourquoi **deux approches successives et indépendantes**, l'une pluviométrique, l'autre thermique, précèdent un essai de synthèse climatique.

2.1.1 - Etude de la pluie

Les seules variables retenues sont les valeurs **moyennes mensuelles et annuelles des hauteurs de précipitations** des 320 postes pluviométriques.

Une première analyse de ces données a montré que les postes météo se différencient principalement par la **pluviométrie moyenne annuelle totale** (exprimant à elle seule 73 % de la variance).

Vient ensuite la pluviométrie estivale (juin + juillet + août) qui traduit 15,5 % de la variance.

Enfin, 2 types de régimes hydriques ont pu être mis en évidence (printanier ou automnal prépondérant) mais n'expriment que 4,2 % de la variance.

Une deuxième analyse, la classification, a créé 8 groupes stables selon ces trois facteurs.

Leurs caractéristiques sont développées dans le tableau 1.

Les deux principales données de chaque groupe (pluie totale et pluie d'été) sont illustrées par la figure 2 (avec l'écart absolu des mesures dans chaque groupe).

Une autre représentation de ces données est fournie par la figure 3, où l'on peut observer, en outre, les données moyennes mensuelles de chaque groupe.

Gr	Effectif	Pluie annuelle (mm)		Pluie d'été (mm)		Régime hydrique R %	
1	20	1429	2122	160	281	25	63
		1640		220		34,2	
2	17	1110	1428	151	218	25	46
		1253		173		34,9	
3	28	1060	1348	178	362	33	77
		1175		240		41,7	
4	21	769	1005	189	263	33	51
		875		221		39,1	
5	49	769	1145	132	235	26	65
		996		189		39,4	
6	67	680	912	115	201	24	69
		789		147		41,4	
7	37	844	1154	70	155	29	59
		962		112		37,1	
8	81	422	819	52	137	22	66
		645		92		32,9	

x1	x2	x : valeurs extrêmes
y		y : valeurs moyennes

$$R = \frac{\text{Pluie d'Avril}}{\text{Pluie de Septembre} + \text{Pluie d'Octobre}} \%$$

Tableau 1 : Caractéristiques des huit groupes pluviométriques

=====

Figure 2

Hauteurs moyennes des précipitations
annuelles et estivales par groupe

Pluie/mm

2 000

1 500

1 000

500

0

← Précipitations totales annuelles

Poste le plus arrosé du groupe

Moyenne des postes du groupe

Poste le moins arrosé du groupe

Pluies d'été (juin, juillet, août)

1 500

1 000

500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Très

Pluie totale : Abondante

Abondante

Abondante

Faible

Assez

Abondante

Faible

Assez

Abondante

Très faible

Pluie d'été : Abondante

Assez
Faible

Abondante

Abondante

Assez
Faible

Faible

Très
FaibleTrès
Faible

Figure 3

Variation annuelle des hauteurs de précipitations dans les 8 groupes pluviométriques

Le groupe 1 (20 postes) est caractérisé par une **pluviométrie annuelle totale** très élevée (il comprend un des postes les plus arrosés de France, au Mont Aigoual), mais aussi par un **déficit estival relativement important**. Il est caractéristique de la barrière Sud-Est du Massif Central.

Le groupe 2, (17 postes) possédant lui aussi une **forte hauteur de pluie totale** montre un **déficit estival encore plus marqué**. Il est présent sur les premières chaînes qui s'opposent aux vents marins : premières chaînes des Alpes Maritimes, pentes des Cévennes.

Ces deux groupes se distinguent nettement du reste de l'échantillon par une forte hauteur d'eau annuelle et une lame d'eau mensuelle supérieure à 100 mm en dehors de la période estivale.

Le groupe 3, (28 postes) dont la **pluviométrie totale annuelle** reste relativement haute (toujours supérieure à 1000 mm), présente la **hauteur d'eau estivale la plus élevée** (240 mm en moyenne).

Il est fréquent dans les Alpes, ainsi que sur l'Aubrac (Lozère), dans le pays de Sault (Aude) et le Massif du Canigou (P.O.), où il semble lié à des conjonctions locales d'effets de relief et d'influences océaniques.

Le groupe 4 (48 postes) se distingue globalement par une **courbe mensuelle** des précipitations beaucoup **plus plate** que les autres groupes et notamment une lame d'eau de juillet du même ordre de grandeur que celles des mois de janvier, février et mars. De plus c'est le seul qui ne présente pas une chute de la pluviométrie d'avril et une augmentation marquée de septembre.

Ceci, ajouté aux pluviosités marquées de mai, juin et octobre dénote une **influence plus continentale que méditerranéenne**. On trouve en effet cet indice en Margeride, dans les Alpes internes, et, dans les Pyrénées, sur les Massifs du Capcir, des Aspres et du Vallespir.

Le groupe 5, (21 postes) qui présente des pluies totales encore relativement hautes et un **déficit estival marqué** mais non excessif, assure la **transition** entre les groupes d'altitude, qui viennent d'être décrits, et les groupes suivants, plus xériques. Ce groupe est caractéristique, à l'est du Rhône, des Préalpes sèches (Plateau d'Albion, Baronnies, ouest des Préalpes de Digne et Castellane). A l'ouest du Rhône, il est présent sur les garrigues du Gard à proximité des Cévennes, sur les Causses de Lozère, dans le Sud du pays de Sault et les Corbières occidentales.

Les groupes 6 et 8, les **plus xériques**, ont des profils parallèles, le groupe 6 étant un peu plus favorable, tant pour la pluie totale que pour la pluie d'été.

Le groupe 6 (67 postes) caractérise les plateaux de Provence et des garrigues du Languedoc, ainsi que les collines des Corbières et du Roussillon.

Le groupe 8, (81 postes) de loin le plus représenté et le **plus méditerranéen**, comprend toutes les zones littorales à basse altitude, à l'exception de la côte d'Azur.

Enfin, le groupe 7, (37 postes) dont la **pluviométrie totale** est assez élevée, mais la **lame d'eau estivale** très basse, se retrouve dans les collines du Var et des Alpes-maritimes, ainsi que sur les avant monts du Sud du Massif Central.

La répartition géographique des groupes pluviométriques est représentée sur la figure 4.

Figure 4 - Etude de la pluviométrie en région méditerranéenne

REPARTITION DES 8 INDICES PLUVIOMETRIQUES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

2.1.2 - Etude de la température

Les variables prises en compte dans les 173 postes thermiques sont :

- * les moyennes des températures extrêmes (maxima et minima) mensuelles et annuelles. Parmi elles se trouvent en particulier :
 - la moyenne des minima du mois le plus froid (m),
 - la moyenne des maxima du mois le plus chaud (M).
- * les températures moyennes mensuelles et annuelles (déduites des précédentes).

L'analyse de ces données a montré que les postes thermiques se distribuaient essentiellement selon deux caractéristiques principales :

- la "température moyenne annuelle" (exprimant 84,6 % de la variance).
- l'amplitude thermique entre le mois le plus froid et le mois le plus chaud (11 % de la variance).

Par suite, la classification a créé 7 groupes stables en fonction des trois facteurs :

T : température moyenne annuelle,
 M : moyenne des maxima du mois le plus chaud,
 m : moyenne des minima du mois le plus froid.

Leurs caractéristiques sont développées dans le tableau 5 et la figure 6.

De l'analyse de variance réalisée mois par mois sur les facteurs retenus, il ressort que :

- les groupes 1 (5 postes), 2 (23 postes) et 3 (23 postes) se distinguent des autres par des minima négatifs,
- les groupes 4 (30 postes) et 5 (28 postes), relativement chauds, mais à hivers froids ont des profils similaires pour les minima d'août à avril. Leurs moyennes des minima du mois le plus froid sont d'ailleurs égales;
- seuls les groupes 6 (37 postes) et 7 (18 postes), les plus chauds à hiver tempéré présentent des températures moyennes mensuelles analogues pour les mois de juillet et août ; ces deux groupes correspondent de toute évidence aux zones les plus littorales;
- les valeurs des amplitudes thermiques extrêmes (M-m) sont du même ordre pour l'ensemble des groupes, sauf pour le groupe 7, le plus maritime.

Pour ce qui est de la répartition géographique de ces groupes, elle est plus simple et régulière que celle des groupes pluviométriques qu'elle recoupe fréquemment par ailleurs.

Mis à part quelques postes placés dans des conditions particulières, il apparaît que la répartition des groupes se fait en fonction de deux éléments prépondérants et non indépendants :

- l'altitude du poste thermique,
- la distance au littoral.

Les postes vont donc se distribuer depuis le groupe 7 (caractéristique d'une étroite frange littorale), jusqu'au groupe 1 qui va comprendre les quelques postes installés sur les sommets (Aigoual, Ventoux par exemple) ou dans les vallées d'altitude.

Gr	Effectif	m (°C)		T _m (°C)		T _M (°C)		Amplitude M-m (°C)	
1	5	-8,9	-4,5	4,5	4,8	16,0	20,7	20,5	29,6
			-7,3		4,6		18,8		26,1
2	23	-9,0	-2,2	5,8	8,6	19,5	25	23,1	33,6
			-5,0		7,2		22,5		27,5
3	23	-4,7	0,9	9,0	11,2	22,8	28,9	23,0	32,6
			-1,9		10,1		25,5		27,4
4	30	-1,4	2,7	11,0	13,2	24,7	34,5	22,5	33,2
			0,8		12,2		27,5		26,7
5	37	-2,4	2,1	11,6	14,0	27,9	30,9	26,6	32,0
			0,8		13,2		29,4		28,6
6	37	0,5	4,8	13,6	15,6	26,6	33,0	23,4	32,3
			2,7		14,2		29,0		26,3
7	18	4,0	7,3	13,8	15,8	23,7	28,2	16,8	23,6
			5,4		15,0		26,9		21,5

m : T° moyenne des minima du mois le plus froid

T_m : T° moyenne annuelle

M : T° moyenne des maxima du mois le plus chaud

x1	x2	x1 et x2 : valeurs extrêmes y : valeurs moyennes
	y	

Tableau 5 : Caractéristiques des sept groupes thermiques

=====

Cette étroite corrélation entre les données de température, l'altitude et la distance au littoral, rend plus délicate, dans les régions à relief accusé, la cartographie en grands ensembles thermiques, puisque sur une même montagne se succèderaient vraisemblablement plusieurs indices, sans qu'aucun poste n'en témoigne. Cette remarque rejoint la notion classique d'étage de végétation, qui ne peut être mise en évidence ici par manque de postes météorologiques en altitude.

La cartographie des groupes thermiques revient donc à faire se succéder les indices en fonction de l'altitude à partir des repères de base que constituent les postes thermiques, et ce, en s'aidant de la carte de végétation.

2.1.3 - Synthèse "pluie - température"

A l'issue de ces deux analyses indépendantes, la combinaison des 8 groupes de pluie et des 7 groupes de température permet d'envisager une synthèse. Le tableau 7 ventile les 128 postes pluviothermiques dans les 56 combinaisons (en pratique, seuls 34 cas sont représentés).

Afin de caractériser les grands types climatiques présents en région méditerranéenne, trois indices climatiques classiques sont portés dans ce tableau.

. Q2 : quotient pluviothermique d'Emberger

$$Q2 = \frac{2000P_{\text{TOTALE}} \text{ (mm)}}{(M+m+546) \text{ (M-m)} \text{ (en } ^\circ\text{C)}}$$

. n : nombre de mois secs calculé à partir du diagramme ombrothermique de GAUSSEN

$$P \text{ (mm)} < 2T \text{ (} ^\circ\text{C)}$$

. s : indice de xéricité d'Emberger ou indice de sécheresse estivale

$$S = \frac{P \text{ été (mm)}}{M \text{ (} ^\circ\text{C)}}$$

Une observation attentive permet de constater qu'aucun de ces indices n'est en lui-même une synthèse climatique : l'indice de Gaussen est plus orienté vers l'évaluation de la sécheresse estivale, le quotient d'Emberger vers la reconnaissance des étages de végétation.

Mais, dans leur construction, ces indices utilisent les mêmes données que celles étudiées pour établir nos groupes thermiques et pluviométriques homogènes.

On peut alors penser, si notre typologie est suffisamment fine,

- 1 - retrouver dans des mêmes types des postes de même indice,
- 2 - dans certains cas, comme dans l'exemple suivant, affiner la classification issue de la simple comparaison des indices climatiques.

Tableau 7 : Les 128 postes pluviométriques

=====

Pluies	1	2	3	4	5	6	7	8	MOYENNE
1	1 371 17,3 0			2 102 10,3 0	1 130 11,6 0				4 176 12,4 0
2	1 217 9,6 0	1 184 9,5 0	6 154 10,9 0	1 116 10,1 0	5 126 8,5 0	2 86 6,7 0			16 140 9,4 0
3	4 228 8,4 0		4 169 10,9 0	1 101 7,5 0	5 122 7,8 0	4 91 6,3 0,5		1 106 4,9 1	19 149 8,1 0,2
4	3 179 6,3 1	3 162 6,1 1	1 146 12,7 0		2 114 6,3 0,5	11 100 5,3 1,1	1 132 4,7 1	1 83 4,4 2	22 123 5,9 1
5	1 182 7,1 1	2 144 6 1			2 124 5,8 1	7 98 4,4 1,3	8 120 3,8 1,8	6 80 3,6 1,7	26 109 4,4 1,5
6		1 144 5,5 1				1 106 4 1	5 122 3,6 2,4	21 84 3,1 2,8	28 93 3,3 2,6
7							1 140 3,5 3	12 102 2,7 3	13 104 2,7 3
MOYENNE	10 222 8,7 0,4	7 157 6,5 0,9	11 158 11,1 0	4 105 9,6 0	15 123 7,8 0,2	25 97 5,3 1	15 123 3,8 2	41 89 3,1 2,6	128 119 5,7 1,4

R : effectif

n : nombre de mois secs

Q2 : Quotient d'Emberger

S : Indice de xéricité

	N
Q2	
S	
R	

Voici en effet deux postes tout à fait comparables vis à vis du Quotient pluviothermique d'Emberger, du nombre de mois secs et de l'indice de xéricité, mais qui, s'il font partie du même groupe de température, sont en réalité très différents quant au régime de pluie :

Caractéristiques pluviothermiques	LE VIGAN (Gard)	AURIAC (Aude)
Quotient pluviothermique	147	132
Nombre de mois secs	1	1
Indice de xéricité	4,7	4,7
Groupe de pluie	1	7
Pluie annuelle (mm)	1429	991
Pluie d'été (mm)	161	126
Régime Avril/septembre + Octobre %	30	53
Groupe de température	4	4
Température annuelle (T moy °C)	12,7	11,0
Maxima du mois le plus chaud (Tmax °C)	34,5	26,6
Minima du mois le plus froid (Tmin °C)	1,3	0,4

2.2 - Etude lithologique

L'étude du substrat s'est limitée aux qualités potentielles de diverses roches mères vis à vis de leur altération, donc des sols auxquels elles peuvent donner naissance, (réserve en eau et en éléments minéraux) et donc de la végétation qui peut y croître.

Elle a été menée essentiellement à l'aide des cartes géologiques disponibles.

On peut schématiquement représenter ainsi les différentes "familles lithologiques" qui ont servi de base au tracé des limites.

Les cartes géologiques indiquent rarement la lithologie : les légendes sont stratigraphiques et les correspondances stratigraphie/lithologie varient de région en région.

Le tableau 8 vise à faciliter les transcriptions, région par région, des légendes stratigraphiques en faciès lithologiques, pour une partie de la région Languedoc-Roussillon et à titre d'exemple.

Tableau 8 :

CORRESPONDANCES REGIONALES STATIGRAPHIE/LITHOLOGIE

Etage	Région	Etage	Faciès
Socle	Cévennes		Séries micaschisteuses épizonales à mésozonales
			Gneiss
			Granites intrusifs
	Montagne Noire		Zone axiale de paragneiss Schistes épizonaux
Paléozoïque antéstéphanien	Montagne Noire	Cambrien	Formation schisto-gréseuse Grès Calcaires et dolomies Schistes Schistes et quartzites
		Ordovicien	Schisto-gréseux de type flyschoidé
		Silurien	Schistes carburés
		Dévonien	faciès quartzeux détritique Dolomies Schistes et calcaires Marbre
		Carbonifère inférieur	Schistes Calcaires noduleux Calcschistes Flyschs schisto-gréseux
Stéphanien Permien	Bassin du Gard	Stéphanien	Grès, conglomérats, schistes
	Graissessac		Conglomérats Epandages détritiques Charbon
	Lodève	Autunien	Conglomérat Grès, pélites
	Lodève	Saxonien	Conglomérat rouge Grès grossier Pélites argileuses

(suite)

Etage	Région	Etage	Faciès
Trias	Bordure cévenole Causses Lodévois		Conglomérats, galets de quartz Grès Argiles gréseuses Argiles Dolomies Marnes
	Corbières		Marnes rouges Conglomérats Pélites et grès fins Dolomies
Jurassique inférieur = Lias	Bordure Vivaro-cévenole	Hettangien	Calcaires oolithiques Série argilo-carbonatée Calcaires noduleux
		Sinémurien Carixien	Calcaires
	Causses Languedoc	Hettangien	Calcaire noduleux dolomitisé Dolomies
		Sinémurien	Calcaires Calcarénites Calcaires bioclastiques
		Carixien	Alterances calcaires fins et marnes Calcaires siliceux
		Domérien	Marnes
		Toarcien	Schistes cartons Marnes
	Corbières	Hettangien	Complexe dolomitique
		Domérien	Complexe calcaires terrigènes Marnes
		Toarcien	Schistes cartons Calcaires argileux Marnes

(suite)

Étage	Région	Étage	Faciès
Jurassique moyen = Dogger	Corbières	Aalénien	Marnes noires marno-calcaires
		Bajocien	Calcaires à oncolites et à chailles
		Bathonien	Calcaire ferrugineux Calcaires blancs massifs
	Causses		Calcaires Dolomies Dolomie ruiniforme
	Bordure vivaro cévenole		
Jurassique supérieur = Malm	Bordure ardéchoise	Oxfordien	Marnes, Terres Noires Calcaires argileux
		Kimméridgien	Calcaires, marno-calcaires
		Tithonique	Calcaires, calcaires argileux
	Languedoc Causses	Callovien	Marnes, Terres Noires
		Oxfordien	Marnes Calcaires argileux Calcaires sublithographiques
		Kimméridgien	Calcaires sublithographiques Calcaires massifs ruiniformes
		Tithonique	Calcaire à chailles
	Corbières	Oxfordien	Dolomies Calcaires oolithiques
		Kimméridgien	Calcaires
		Portlandien	Calcaires massifs

3 - LA CARTOGRAPHIE

3.1 - Le passage de la typologie à la cartographie

Le problème de la cartographie est de passer d'une typologie rigoureuse de données ponctuelles, fondée sur des méthodes numériques, à une représentation graphique en surfaces homogènes.

le choix de l'échelle de cartographie a été dicté par la recherche de la meilleure adéquation entre la finesse des renseignements disponibles et l'utilisation de cette cartographie à un niveau régional ou départemental. Le travail de cartographie a été réalisé au 250.000^e pour aboutir à une présentation au 500.000^e.

Dans ce cadre, rappelons que nous disposons de trois typologies :

- 1 - Une typologie lithologique, issue en fait d'une interprétation des cartes géologiques ;
- 2 - Une typologie pluviométrique, issue d'un traitement numérique de données sur des postes homologués ;
- 3 - Une typologie thermique, issue d'un double travail :
 - * un traitement numérique de données météorologiques,
 - * une lecture des cartes de végétation, ainsi que l'existence de travaux déjà réalisés sur les étages de végétation dans la région (cf. M. GODRON).

Chacune de ces typologies pose des difficultés de cartographie qui lui sont propres, et que nous allons examiner une à une pour expliciter nos choix.

3.2 - Découpage en petites régions naturelles

Un secteur écologique, proprement dit, est une unité de terrain homogène quant aux types géologiques, pluviométriques et thermiques définis au chapitre précédent. L'idéal serait donc de pouvoir cartographier séparément chacun de ces types, et de superposer les trois cartes obtenues pour construire la carte des secteurs écologiques. En fait, chacune de ces 4 opérations soulève des problèmes parfois délicats.

3.2.1. Cartographie des types lithologiques

Les types lithologiques étant issus de l'interprétation des cartes géologiques, on pourrait penser que leur cartographie serait aisée. En fait, se pose un problème d'échelle, sous une forme double :

1 - il arrive que des unités (exemple : causses calcaires satellites sur granite comme au col des Tribes en Lozère, ou pointements volcaniques sur le plateau calcaire de l'Escandorgue), aient une taille infime vis à vis des grandes surfaces homogènes (exemple : granite de Margeride, micaschistes des Cévennes, ...). Dans ce cas, nous avons omis de cartographier ces enclaves. Si elles sont connues et présentent une surface qu'il est utile de prendre en compte dans la gestion forestière, elles sont signalées dans la légende (tableaux départementaux).

2 - Il arrive également que les types retenus pour le découpage lithologique se succèdent sur le terrain avec un grain trop fin pour être cartographiés séparément. C'est le cas par exemple de la région naturelle "Versants et Bassins Caussenards", ou du "bassin du Lodevois" où c'est l'hétérogénéité même de faciès qui constitue l'originalité de la région (en général, cette hétérogénéité est corrélée avec une topographie très chahutée). Ces régions sont alors individualisées, et leur particularité lithologique est indiquée dans la légende (tableaux départementaux).

En conséquence, la cartographie des types lithologiques mène à trois types de secteurs lithologiques :

- 1 - les secteurs homogènes,
- 2 - les secteurs homogènes, avec enclaves,
- 3 - les secteurs hétérogènes.

Le type de secteur lithologique cartographié est indiqué dans la légende que constitue les tableaux départementaux.

3.2.2. Cartographie de types pluviométriques

La difficulté est alors autre : la typologie est issue de traitements de données numériques mesurées dans des stations météorologiques, et est donc fondée sur des informations ponctuelles. La carte est en revanche une surface. La difficulté est de passer d'un ensemble de points à une surface.

La démarche utilisée est alors constituée des trois étapes suivantes :

- 1 - Des régions homogènes ont été créées en enveloppant par des courbes les postes pluviométriques appartenant au même type ;
- 2 - La pertinence de ces régions a été vérifiée (élimination des postes isolés, interprétation plausible des zones ainsi définies ...) ;
- 3 - Les limites réelles des secteurs pluviométriques ont été choisies par interprétation des cartes topographiques, en asseyant autant que faire se peut les limites pluviométriques sur des crêtes majeures dans le paysage.

Il reste cependant clair dans notre esprit qu'il ne faut pas considérer les limites ainsi tracées comme des frontières imperméables à tout changement climatique, mais comme des lignes tampon au travers desquelles s'observent des changements climatiques graduels.

3.2.3. Cartographie des types thermiques

La cartographie des types thermiques est la plus complexe, car les variations de température recouvrent deux phénomènes :

1 - l'altitude, mal représentée par les types thermiques issus de traitements numériques à cause du sous-échantillonnage des zones d'altitude et la quasi absence de postes en montagne pour en assurer une cartographie directe fiable,

2 - la distance à la mer et le compartimentage en grands massifs (Cévennes, Canigou, ...), correctement représentée par les types thermiques définis par traitements numériques et facilement cartographiable.

D'autre part, la distance à la mer et le découpage en grands massifs sont des variables aisément cartographiées à l'échelle d'un découpage du Languedoc-Roussillon, alors que les étages de végétation, liés fortement à l'altitude, peuvent varier de façon très rapide sur quelques kilomètres (ex. : sur l'Aigoual entre le sommet à 1.565 m et Valleraugues à 400 m sur quelques km de distance à vol d'oiseau).

Aussi, dans la carte synthétique présentée, nous avons délibérément choisi de ne pas cartographier les étages de végétation en montagne. Cette information pourtant fondamentale est donnée dans la légende (tableaux départementaux) par l'indication des étages rencontrés sur la petite région naturelle.

3.2.4. Superposition des secteurs lithologiques, pluviométriques et thermiques

La superposition des trois découpages précédents, avec les compléments fournis dans la légende, devrait amener automatiquement au découpage en petites régions naturelles. Cependant, le croisement des limites lithologiques et climatiques (pluviométriques et thermiques) peut conduire par endroits à un confetti de secteurs, sans intérêt pratique à cette échelle.

Or, il n'y a pas stricte indépendance entre lithologie et climat : la lithologie, en guidant les formes d'érosion, contribue au compartimentage en massifs des piedmonts du Massif Central et des Pyrénées. Ce compartimentage guide lui même la circulation des masses d'air, donc la climatologie régionale. Par exemple, les roches tendres issues des transgressions marines tertiaires sont localisées à des altitudes basses, alors que les calcaires secondaires plus résistants forment la première corniche qui favorise la condensation des masses d'air humide. Cette limite Tertiaire / Secondaire correspond donc à une diminution des températures et une augmentation de la pluviosité.

Cette concordance n'est cependant pas une règle absolue, et en fait trois cas peuvent se présenter :

1 - Les limites climatiques et lithologiques coïncident, ou sont très voisines. On choisit alors de les faire coïncider dans le découpage, et la limite de la petite région naturelle est alors forte.

2 - Les limites climatiques et lithologiques ne coïncident pas, mais isolent des régions de grande taille : plusieurs régions sont alors créés, définis par les limites géologiques ou climatiques : exemple : Cévennes métamorphiques, Cévennes granitiques, Hautes Cévennes métamorphiques, Hautes Cévennes granitiques, ...

3 - Les limites climatiques et géologiques ne coïncident pas, et isolent des régions de petite taille : une seule limite est conservée, l'autre servant à définir une enclave non cartographiée mais décrite dans la légende. Exemple : la partie granitique des Cévennes lozériennes à l'est de Villefort est considérée comme une enclave granitique dans le secteur des Cévennes métamorphiques.

3.3. Conclusion : quelques remarques sur la précision

Ainsi, nous pensons avoir montré que :

1 - la précision de la typologie des secteurs est homogène sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, que l'on soit dans la région méditerranéenne, dans le Massif Central ou dans les Pyrénées,

2 - qu'en revanche bien des éléments n'ont pu être cartographiés à l'échelle de la petite région naturelle en montagne, car la topographie qui reproduit tant le mésoclimat que les variations lithologiques mène à une trop grande complexité dans la cartographie.

Il est alors indispensable, pour une bonne utilisation de ce découpage de se référer aux légendes que sont les tableaux départementaux et où sont indiqués les simplifications réalisées dans le passage de la typologie à la cartographie...

C'est pourquoi il est apparu utile de regrouper ensemble les régions pour lesquelles la cartographie a, globalement, le même niveau de précision. D'autre part, cela permet de mettre l'accent sur les similitudes existant entre des zones éloignées géographiquement, mais de caractéristiques climatolithologiques proches, et, réciproquement, d'éviter de comparer entre eux des secteurs faisant partie d'ensembles différents.

Pour la région, six ensembles écologiques ont été constitués, chacun méritant une approche spécifique :

- A - Ensemble méditerranéen au sens strict,
- B - Ensemble des Pyrénées méditerranéennes,
- C - Ensemble des hautes montagnes Pyrénéennes.
- D - Ensemble aquitainien,
- E - Ensemble du Massif Central méditerranéen,
- F - Ensemble du Massif Central,

L'ensemble A peut être rattaché à son homologue en région PACA. La cartographie y est assez précise compte tenu de la bonne répartition des postes météo et de la relative simplicité du relief et de la géologie. Les indices climatiques traduisent bien les différents climats locaux.

Les ensembles B et E où le climat méditerranéen reste prédominant, sont soumis à des pénétrations de climats océaniques. De plus, les variations altitudinales, et donc climatiques, y sont rapides. Enfin, la géologie de certaines régions est très complexe (Corbières, Lodevois par exemple) et donc non cartographiée dans le détail.

Ces régions sont donc moins homogènes, mais les tendances fortes restent parfaitement valables.

Dans les ensembles C, D et F, les influences méditerranéennes ne sont pratiquement plus sensibles.

Ces ensembles se trouvent de plus à la périphérie de la zone d'étude du climat méditerranéen, et les indices climatiques définis sur cette zone sont parfois insuffisants pour traduire complètement leur climat.

En conséquence, on aboutit finalement à une hiérarchie de découpages successifs emboîtés, dont chaque niveau mérite une approche bien spécifique :

4 - CARTES ET TABLEAUX EXPLICATIFS

4.1 - Cartes

Les limites des régions naturelles sont reportées sur fond de carte physique IGN au 1/500.000^e.

En trait plus épais figurent les limites des ensembles écologiques.

4.2 - Tableaux explicatifs

Pour plus de commodité, il a été fait un tableau par département.

Chaque petite région naturelle est décrite sommairement par :

- un numéro et un nom,
- un climat décrit soit par les indices déjà explicités, accompagnés d'un qualificatif résumant très sommairement les caractéristiques de cet indice,
- la mention des étages de végétation rencontrés sur la région naturelle (d'après la carte établie par M. GODRON),
- la forme du relief,
- une mention sommaire de la lithologie.

PETITES REGIONS NATURELLES DU LANGUEDOC - ROUSSILLON

définies par la lithologie et le climat

— Limite des petites régions naturelles

○ N° des régions se référant à la légende détaillée (tableaux explicatifs)

— Limite des ensembles de régions apparentées :

- A** Ensemble méditerranéen au sens strict
- B** Ensemble des Pyrénées méditerranéennes
- C** Ensemble des Hautes Montagnes Pyrénéennes
- D** Ensemble Aquitainien
- E** Ensemble du Massif Central méditerranéen
- F** Ensemble du Massif Central

Echelle : 1/500.000ème

PETITES REGIONS NATURELLES DU LANGUEDOC - ROUSSILLON

définies par la lithologie et le climat

LEGENDE

— Limite des petites régions naturelles

N° des régions se référant à la légende détaillée (tableaux explicatifs)

Limite des ensembles de régions apparentées :

A

Ensemble méditerranéen au sens strict

E

Ensemble du Massif Central méditerranéen

F

Ensemble du Massif Central

Echelle : 1/500.000ème

N O M B R O	N O M S	C L I M A T				E t a g e s d e v e g e t a t i o n (d'après M. GODRON)	R E L I E F	S U B S T R A T
		P L U V I O M E T R I E		T E M P E R A T U R E				
		Indice Pluviométrie annuelle	Pluviométrie estivale					
14	Vallée du Rhône Carnagne	8		6	très chaud	Mésoméditerranéen inférieur	Plaine	Alluvions récentes
15	Costières		très faible	6-5	très chaud chaud		Plateau peu élevé escarpements localisés	Alluvions anciennes
16	Garrigues de Nîmes	6	faible	5		Mésoméditerranéen inférieur	Plateaux Collines	Marnes et calcaires marneux dominants
17	Garrigues de Pompihan	5	assez abondante			Mésoméditer. inférieur	Escarpements localisés	Calcaires durs dominants
18	Garrigues Gardo-Ardechoises	6	assez abondante			Mésoméditer. supérieur		
19	Garrigues de Remoulins	6	faible	6-5	chaud	Mésoméditerranéen inférieur		
20	Bassin d'Uzès et d'Alès	6-5	faible assez abond.				Plaine	Marnes - sables - argiles
21	Basse Céze	6	faible				Plaines et basses collines	Roches sédimentaire sabieuses dominantes
54	Bassin boullier	2-1		5-4		Mésoméditerranéen supérieur		Schistes et grès
50	Basses Cévennes sédimentaires		abondante très abondante		chaud assez chaud	Mésoméditer. inférieur Mésoméditer. supérieur Supra méditerranéen	Vallées parallèles	Grès et calcaires divers
53	Basses Cévennes métamorphiques	1		4-3		Mésoméditerranéen supérieur Supra méditerranéen	NO - SE Pentes fortes	Schistes - micaschistes (localement : gneiss) Granites
51	Basses Cévennes granitiques				assez chaud frais	Montagnard méditerranéen		
57	Hautes Cévennes métamorphiques			2		Montagnard		Schistes - micaschistes (localement calcaires et dolomies)
58	Hautes Cévennes granitiques				froid	sub atlantique	Reliefs arrondis	Granites
52	Bassin de Vigan		très abondante	4-3		Mésoméditer. supérieur Supra méditerranéen	Dépressions collines	Schistes - calcaires et dolomies métamorphisés
48	Larzac	2-1	abondante très abondante		assez chaud frais	Supra méditerranéen Montagnard méditerranéen	Plateaux Pentes	Calcaires durs - dolomies Calcaires et marnes
55	Causse Noir	5	assez abond. assez faible	3	frais	Supra atlantique Montagnard sub atlantique		

N°	LIEUX	CLIMAT			Etages de végétation (d'après M. GODRON)	RELIEF	SUBSTRAT
		PLUVIOMETRIE		TEMPERATURE			
		Indice Pluviométrique annuelle	Indice Pluviométrique estivale				
9	Plaine du Languedoc	a	< 600 mm	7-6	Thermo et Mésoméditerranéen	Plaine → alluvions, sables, argiles Coteaux → calcaires marneux, marnes, flysch Formations tabulaires → basaltes, calcaires durs	
b			doux-très chaud				
8	Minervois	8		6-5	Mésoméditerranéen	1er relief → calcaires argileux, marneux, gréseux, dolomie	
10	Causse d'Annonciades	très faible		très chaud-chaud	inférieur	Plateau Hauteurs : calcaires durs et dolomies	
11	Pindé Nord Montpellier	très faible		5		Fossés : [: alluvions, argiles : grès, conglomérats Collines : [: marnes, calcaires marneux : calcaires lacustres Formations tabulaires : [: calcaires durs : brèches	
12	Pli de Montpellier	6			Mésoméditerranéen supérieur	Plateau et fossés dominants	
16	Garrigues de Nîmes	faible		faible	supérieur	Collines Marnes, calcaires marneux - affleurements calcaires durs	
13	Glacis de Viol de fort	6-5		chaud	Mésoméditerranéen inférieur et supérieur	Plateau faillé Calcaires durs	
17	Garrigues de Pompignan	5		5-4	Mésoméditerranéen supérieur	Plateaux Calcaires durs et marneux à intercalations de marnes	
49	Buege et gorge de l'Hérault	2		4	Mésoméditerranéen supérieur supra méditerranéen	Montagne escarpée, plateau et gorge → Calcaires durs et massifs, dolomies massives → Calcaires marneux, marnes, calcaires dolomitiques	
48	Larzac	2-1		3	Supra méditerranéen et Montagnard méditerranéen	Plateau → Calcaires durs, dolomies Pentes Marnes, grès, pondings =====	
47	Escandorgue	abondante		Assez faible		Lameaux de causses creusés, échancrés et pointements volcaniques → basaltes, tufs, brèches volcaniques	
46	Fosse de Bédarioux et Bassin de Lodevois	7-2		5 chaud	Mésoméditerranéen inférieur et supérieur	Dépressions → Argilites, grès, conglomérat Reliefs et formations tabulaires → Basaltes, calcaires, dolomies Piémonts et pentes des Causses → Calcaires marneux, marnes, grès + dolomitiques	
42	AVANTS Monts	7-8		6-5	Mésoméditerranéen inférieur et supérieur et Supra méditerranéen	Basses montagnes Formes arrondies Pente douce face sud Zones basses et versants sud : flyschs schisto-gréseux Borsales : complexe calcaire dolomitique Zones basses et sud, S-E : complexe schisto-gréseux Hauteurs : schistes, grès, quartzites	
44	Axe Orb JAUGE	7		très chaud - chaud		Expo Nord : complexe schisto-gréseux et calcaireux Expo Sud : schistes, micaschistes puis gneiss	
45	Monts de Mare	2		5-4	Mésoméditerranéen supérieur et Supra méditerranéen	Grand fossé Est-Ouest Montagnes et vallées, pentes fortes ZONE NORD : formation schisto-gréseuse + carbonatée et dolomie + granites et roches métamorphiques VERSANT ET PIEDMONT DE L'ESPINOUSE-CARONZ : schistes et micaschistes	
43	Montagne noire des verreries de Mousans	4-3		assez chaud - frais	Supra méditerranéen	Montagnes Complexe calcaireux, schistes	
56	Espinouse	abondante		assez faible	Montagnard subatlantique	Plateau d'altitude Gneiss et granites	

Numéro	N O M S	C L I M A T			Etages de végétation (d'après M. GODRON)	R E L I E F	S U B S T R A T	M E T A M O R P H I Q U E
		P L U I O M E T R I E		TEMPERATURE				
		Indice Pluviométrie annuelle	Pluviométrie estivale					
55	Haute Cabardes	1 très abondante	3 abondante	3	Montagnard sub atlantique	Montagnes et Plateaux	Roches	
40	Saïssac	3 abondante	abondante	frais	Montagnard subatlantique Supra méditerranéen Mésoméditerranéen supérieur	Plateaux	Cristallophylliennes	
41	NOIRE	7	abondante	3-4	supra méditerranéen Mésoméditerranéen supérieur et inférieur	Montagnes escarpées	Sédiments primaires schisto-gréseux	
42	Bas Cabardes - Minervois	Assez abondante	très faible	assez frais - chaud	Mésoméditerranéen inférieur	Pentes fortes		
7	Cabardes viticole	6	très faible	4	Mésoméditerranéen inférieur	Plaines, coteaux petits causses et 1er contrefort de relief	Molasses, argiles, cailloutis, calcaires marneux Calcaires durs, marneux et marnes	
39	Pièges et Barès	6	abondante	4	Supratlantique	Collines	Molasses	
33	Quillanais	faible	faible	assez chaud	et Mésoméditerranéen supérieur	Basses montagnes escarpées	Flyschs calcaires et calcaires divers	
6	Limouxin	faible	faible	assez chaud	Mésoméditerranéen supérieur et inférieur	Collines	Molasses	
8	Minervois	8	abondante	6	Mésoméditerranéen inférieur	Plaines, coteaux petits causses et 1er contrefort de relief	Molasses, argiles, cailloutis, calcaires marneux Calcaires durs, marneux et marnes	
9 b	Plaine viticole	8	abondante	très chaud	Mésoméditerranéen inférieur	Plaines et collines	Alluvions	
4 a	Corbières Maritimes	7	abondante	7	très chaud	Belief ± escarpé	Calcaires durs	
b		7	abondante	doux		Localement assez hauts	Molasses, marnes, calcaires marneux	
5	Basses	très faible	très faible	6	Mésoméditerranéen supérieur et inférieur	Basses montagnes assez tourmentées	Molasses, marnes, calcaires marneux	
30	Corbières	6	abondante	5	Mésoméditerranéen supérieur et inférieur Montagnard	Basses montagnes assez tourmentées	Molasses, marnes	
29	EST	faible	faible	chaud	Mésoméditerranéen supérieur et inférieur Supra méditerranéen	Montagnes et plateaux	Schistes, calcaires et calcoschistes primaires	
31	HAUTES CORBIÈRES	5	abondante	4-3	Supra méditerranéen	Montagnes et plateaux	Calcaires durs, grès, marnes	
32	de Valmigrè	5	abondante	assez chaud - frais	Montagnard	Montagnes et plateaux	Calcaires durs, grès, marnes	
37	PAYS de SAULT	Assez abondante	assez faible	3	Montagnard	Montagnes Plateaux et gorges Plateau d'altitude et haute montagne	Calcaires durs → Calcaires durs → Flyschs, calcaires et marnes schisteuses Granites, calcaires métamorphisés, complexe calcoschisteux et grés-schisteux	
36	Chalabrais	3	abondante	frais	Montagnard subatlantique et Supratlantique	Basses montagnes arrondies	Molasses	
38		abondante	abondante	4	Montagnard subatlantique et Supratlantique	Basses montagnes arrondies	Molasses	

N°	NOMS	CLIMAT			Étapes de végétation (d'après M. GODERON)	RELIEF	SUBSTRAT
		PLUVIOMÉTRIE		TEMPÉRATURE			
		indice annuelle	indice estivale				
2 ^a b	Plaine du Roussillon	< 600 mm		7-6 doux très chaud	Plaine et collines	Alluvions et toutes roches des reliefs environnants	
4 ^a b	Corbières Maritimes	< 600 mm		8 très faible	Relief côtier Petites montagnes	Calcaires durs	
3	Vallée de Maury				6-5 très chaud-chaud	Versants et collines	Marnes schisteuses
27	Penouillèdes			5-4 chaud-assez chaud	Moyennes montagnes très découpées et abruptes	Granites, gneiss + schistes et calcaires métamorphiques	
1	Albères Maritimes			7 doux	Relief côtier haut et très abrupt	Schistes	
22	Albères du Perthus			6 très faible	Chaîne montagneuse massive Pente forte	Gneiss	
25	Aspres et confient				4-5 chaud assez chaud	Coteaux et versants des hauts massifs voisins	Schistes
26	Roque Jalère			4-3 assez chaud-frais		Granites	
28	Confins avec pays de Sault			3 frais	Montagne	Granites et calcaires métamorphisés	
24	Valespir et Aspres Hautes			4 assez chaud		Gneiss	
23	Valespir et Albères Hautes				3-2 frais - froid	Montagne	Granites Schistes
34	Canigou			2 froid	Montagne	Granite	
35 ^a b	Capcir et Cerdagne				4 faible abondante	Sub alpin, Alpin, Méditerranéens	Moraines Schistes

Gradient de
continentalitéGradient
d'altitudeGradient
d'altitude

Noms	CLIMAT				Etages de végétation	RELIEF	SUBSTRAT
	PLUVIOMETRIE		TEMPERATURE				
	Indice Pluviométrique annuelle	Indice Pluviométrique estivale					
61	3 Abondante		2		Montagnard inférieur	Plateaux et vallées	Gneiss, micaschistes, Magnatites, leptynites
63	4 Faible		2		Montagnard moyen Montagnard supérieur	Plateaux et failles	Granite
62	5-4				Montagnard inférieur Montagnard moyen	Plateaux	
64	Assez Abondante Faible		3		Collinéen Montagnard inférieur	Plateaux et vallées	Micaschistes et placages de grès arkosiques
65	3 Abondante		Froid		Montagnard moyen Montagnard supérieur	Plateaux	Basalte
58	1-3 Très Abond. Abondante		2-1 Froid à très froid		Montagnard Subalpin	Plateaux et failles Vallées	Granite
57	1		2 Froid		Montagnard	Vallées	Micaschistes
53	Très Abondante		3		Supra méditerranéen		
59	6-5 faible assez abond.		3		Supraalpinique	Plateaux	Calcaires, dolomies
60	5 Assez Abondante		Frais		Montagnard inférieur	Bassins, vallées, petits reliefs tabulaires	Calcaire, dolomies, marnes et calcaire marneux

BIBLIOGRAPHIE

I - Principaux ouvrages consultés

- AOUIZERATS N., LAMY Ph., 1977 - Contribution à la connaissance climathologique de la Provence en vue d'applications agro-météorologiques - Rapport de stage, Ecole Nationale de la météorologie
- AUVRAY F., 1987 - Typologie des Fenouillèdes - Inventaire Forestier National.
- AUVRAY F., 1987 - Typologie forestière des Aspres - Inventaire Forestier National.
- ASCENSIO E., 1983 - Aspects climatologiques des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Ministère des transports, Direction de la météorologie.
- ASCENSIO E., 1984 - Aspects climatologiques des départements de la région Languedoc-Roussillon - Ministère des transports, Direction de la météorologie.
- CANET I., 1982-83 - Eléments climatologiques du Languedoc-Roussillon - Ecole Nationale de la Météorologie.
- DAGET Ph., 1980 - Un élément actuel de la caractérisation du monde méditerranéen : le climat, Colloque de la fondation L. Emberger sur "la mise en place, l'évolution et la caractérisation de la flore et de la végétation circumméditerranéenne" - Montpellier 9-10 Avril 1980 - Naturalia Monspeliensa, n° hors série.
- DARRACQ S., 1987 - Typologie Forestière du Sommail - Espinouze, Inventaire Forestier National.
- EPENOUX F. D', 1988 - Typologie Forestière des Basses Cévennes à Pin maritime - Inventaire Forestier National, Montpellier.
- EMBERGER L., 1943 - Les limites de l'aire de végétation méditerranéenne en France - Extrait du Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse.
- GODRON M., DARRACQ S., ROMANE F., 1984 - Typologie Forestière de la région des garrigues du Gard - ENGREF, Nancy.
- GUIOT J., 1986 - Sur la détermination de régions climatiques quasi-homogènes - Revue de statistiques appliquées, Vol XXXIV, n° 2, pp. 15-34.

Documents cartographiques

- Cartes IGN au 1/100 000^e et 1/250 000^e.
- Cartes climatiques détaillées de la France au 1/250 000^e, CNRS - Section de Géographie.
- Carte de végétation de la France au 1/200 000^e, CNRS.
- Cartes Géologiques au 1/320 000^e, 1/250 000^e, 1/80 000^e, 1/50 000^e - Ministère de l'Industrie, BRGM.

II - Rapport et Publication CEMAGREF - Groupement d'Aix-en-Provence

- BOURDENET Ph. - Enquête sur le Cèdre en Languedoc-Roussillon et possibilité d'extension - Mémoire ENITEF, 1977.
- BOUVET J.Y. - Le cyprès vert "Cupressus sempervirens" en zone méditerranéenne française - Mémoire de stage ENITEF, Nov. 1983 (137 p.).
- LABADIE J. - Etude des exigences écologiques du Pin pignon en région méditerranéenne française - Mémoire de Stage ENITEF, Nov. 1983 (100 p.).
- BICHARD D. - Classes de croissance du chêne vert dans le Sud-Est de la France. Leur relations avec quelques caractéristiques de la station, Août 1983. (56 p. + annexes).
- COMMERÇON R. - Comportement du Pin laricio en Région Méditerranéenne Française - Mémoire de 3ème année de l'ENITEF, Juin 1984.
- COLOMBET M. - Ecologie des sapins méditerranéens en Provence et Languedoc, Mémoire de 3ème année de l'ENITEF, Sept. 1984.
- OSTERMEYER R. - Enquête sur les cèdres en Languedoc-Roussillon : résultats complémentaires - Mémoire TSTFE-CFTMA, 1984 (164 p.).
- MONTGOLFIER J. de - Comment gérer la forêt méditerranéenne ? In POUR LA SCIENCE, n° 96, Oct. 1985 (12 p.).
- ALEXANDRIAN D. - Le choix des essences de reboisement en région méditerranéenne française : un exemple de liaison station/production. Colloque Phytosociologie et Foresterie, ENGREF-Nancy, Nov. 1985 (8 p.).
- FRANC A., 1986 - Typologie Forestière de Margeride Lozérienne - CEMAGREF, Groupement de Clermont-Ferrand.
- GOMBAULT C. - Etude des Grands Types de Stations Forestières Méditerranéennes : Première synthèse de l'autécologie des essences de reboisement - Mémoire de stage ENITEF, Nov. 1986 (66 p. + annexes).
- CEMAGREF - Le choix des essences de reboisement en région méditerranéenne française : un exemple de liaison station/production - Informations Techniques du CEMAGREF - cahier n° 63-5, Sept. 1986 (5 p.).
- DRAF du Languedoc-Roussillon, CEMAGREF - T.F. Clermont-Ferrand, APMN Grenoble, TFM Aix - Choix des essences de reboisement en Languedoc-Roussillon - Affiche 120 x 80
- CEMAGREF - Guide Technique du Forestier Méditerranéen Français, Chapitre 3 : Essences Forestières + Classeur (33 fiches), 1987 (96 p.).
- ALEXANDRIAN D., GOMBAULT C. - Le climat de la région méditerranéenne française. Définition des grands types climatiques en vue des études de station (projet d'article pour la RFF), 1987 (21 p.).
- FRANC A., 1988 - Typologie Forestière du Massif Central - CEMAGREF - Groupement de Clermont-Ferrand.
- FRANC A., 1990 - Typologie Forestière des Hautes Cévennes - Eléments pour le choix des essences - CEMAGREF, Groupement de Clermont-Ferrand.

CEMAGREF

GROUPEMENT D'AIX EN PROVENCE
B . P 31 LE THOLONET
13612 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
Telex : GREF AIX 401910 - Télécopie : 42 66 88 65
TEL : 42 66 93 10