

CLE DE DETERMINATION DES TYPES DE STATION FORESTIERE DU BOCAGE BOURBONNAIS

Cette clé permet, comme son nom l'indique, de reconnaître les types de station.

Pour des questions d'encombrement et pour rester pratique, un certain nombre de détails entrant dans la physionomie globale des types n'y sont pas portés. Seuls ont été retenus les critères floristiques ou pédologiques, facilement reconnaissables sur le terrain.

En cas de doute, on se reportera à la fiche d'identité des types concernés pour y puiser des renseignements complémentaires.

Cette clé permet la détermination de l'ensemble des types de station reconnus dans le Bocage Bourbonnais.

Cependant, elle ne s'applique en toute rigueur qu'à des portions de terrain où l'influence de l'homme n'est pas telle qu'elle ait entraîné une modification importante de la flore.

On prêtera donc attention :

- à s'éloigner des lisières, des voies de débardage, etc...
- à effectuer plusieurs sondages à la tarière si l'on trouve des "indices" douteux (morceaux de briques, ...)
- à se méfier de tout ce qui paraîtrait artificiel au niveau de la flore.

Si quelques cas douteux, rares, se présentaient, il faudrait alors faire appel au bon sens pour les affilier au type le plus proche.

CLÉ GÉNÉRALE DES TYPES DE STATION

PLATEAU OU VERSANT

N° du type de station

Charme absent	• Végétation arbustive et herbacée très pauvre mais "recouvrante" dominée par la canche flexueuse, la fougère aigle, présence de leucobryum glauque, dicranum scoparium. • Fréquemment accompagnée de callune, laiche à pilules, mélampyre des prés, germandrée scorodaine, néflier. • Le plus souvent peuplement de chêne sessile, hêtre, bouleau verruqueux... Sol sableux sec. Litière épaisse à tendance fibreuse. Moder ou mor.	-----> 1 p. 23
	• Végétation herbacée très couvrante dominée par la molinie bleue et la bourdaine, bouleau fortement représenté. • Parfois : callune. Sol engorgé une grande partie de l'année. Moder ou mor.	-----> 2 p. 27
Charme à l'état dilué peu vigoureux	• Végétation arbustive et herbacée très pauvre mais "recouvrante" dominée par la canche flexueuse, la fougère aigle. • Fréquemment accompagnée par laiche à pilules, mélampyre des prés, germandrée scorodaine, néflier. • Absence de callune et de leucobryum glauque. • Le plus souvent, peuplement de chêne sessile et hêtre. Sol sableux, bien drainé. Moder ou mull moder.	-----> 3 p. 31
	• Végétation arbustive et herbacée pauvre mais très couvrante dominée par la houlque molle, luzule des bois, lierre terrestre, accompagnés de canche flexueuse, fougère aigle, laiche à pilules, mélampyre des prés, germandrée scorodaine, mélisse à une fleur. Sol frais. Moder ou mull moder.	-----> 4 p. 35
	• Végétation arbustive et herbacée dominée par la molinie bleue et la bourdaine. • Présence du bouleau verruqueux. • Parfois : fougère femelle, fougère spinuleuse, fougère dilatée, callune. Sol engorgé une grande partie de l'année. Moder.	-----> 5 p. 39

Charme abondant et vigoureux	• Strate arbustive et herbacée peu diversifiée et très peu couvrante. • Présence de ronce, houx, chèvrefeuille des bois, anémone sylvie, luzule poilue. • Parfois : muguet, noisetier, euphorbe des bois, lierre terrestre. • Peuplement de chêne sessile, chêne pédonculé accompagné de hêtre. Sol bien drainé. Mull moder ou mull acide.	-----> 6 p. 43
	• Strate arbustive pauvre dominée par : ronce, houx. • strate herbacée peu diversifiée et très peu couvrante : chèvrefeuille des bois, luzule poilue, luzule des bois. • Parfois fraîcheur soulignée par la présence de fougère femelle, fougère spinuleuse, oxalis, canche cespiteuse, lierre terrestre. • Le plus souvent, peuplement de chêne sessile, chêne pédonculé accompagné du hêtre. Sol frais. Humus, mull acide ou mull moder.	-----> 7 p. 47
	• Végétation arbustive diversifiée : noisetier, aubépine commune, rosier des champs, fragon. • Végétation herbacée riche et diversifiée : lamier jaune, fougère mâle, lierre, sceau de salomon, stellaire holostée, violette des bois, euphorbe des bois, euphorbe d'Irlande, mélisse à une fleur, géranium herbe à Robert. Sol frais. Mull. • Peuplement de chêne pédonculé, chêne sessile accompagné de hêtre, parfois merisier, érable champêtre.	-----> 8 p. 51

FOND DE VALLON

• Peuplement linéaire de bordure de ruisseaux, le plus souvent dominé par l'aulne glutineux, accompagné du chêne pédonculé, du charme et du hêtre. • Arbustes assez diversifiés : noisetier, aubépine, ronce, viorne obier, saule à oreillettes, bourdaine. • Végétation herbacée riche et recouvrante : ronce, fougère femelle, fougère spinuleuse, laiche espacée, scirpe des bois, lysimaque vulgaire, jonc diffus, oxalis, circe de lutèce. Sol engorgé. Hydromull ou hydromoder.	-----> 9 p. 55
• Peuplement dominé par le chêne pédonculé accompagné du hêtre, charme, quelquefois merisier, érable champêtre, frêne. • Arbustes assez diversifiés : noisetier, aubépine, rosier des champs, viorne obier. • Végétation herbacée riche et recouvrante dominée par laiche espacée, laiche penchée, scirpe des bois, jonc diffus, lysimaque vulgaire, fougère femelle. Sol engorgé. Humus : hydromull.	-----> 10 p. 56

Cette clé simplifiée, dans laquelle vous progressez de gauche à droite, vous permet de déterminer le numéro du type de station de votre terrain. Vous vous reportez ensuite à la fiche descriptive correspondante.